

## BIJ INSCHUREN

ZIEKTEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	VERNEVELEN	ONDERDOMPELEN (1-2 MIN.)	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
<b>PHOMA (ZWARTROT)</b>	Tecto	thiabendazool	80 ml in 20 l water per ton wortels	200ml in 100 l water		zie (1)	
<b>SCLEROTINIA</b>	Dagonis	difenoconazool+fluxapyroxad	75-100 ml per ton wortels	250 ml in 100 l water	1		
	Luna Privilege	fluopyram	10 ml per ton wortels	20 ml in 100 l water	1		21 dagen
	Switch, Serenva	cyprodinil+fludioxonil	36 g per ton wortels	90 g in 100 l water	1		
	Contans WG	Coniothyrium minitans	50 g in 10-20 l water per ton wortels		1		
<b>PHYTOPHTHORA</b>	Revus, Pergado V	mandipropamid		5 ml in 100l water	1		21 dagen

## KRAAGBEHANDELING

PLAGEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
<b>MINEERVLIEGEN</b>	Tracer	spinosad	0,5 ml/m <sup>2</sup>	1		18 dagen
	Boomerang, Conserve Pro	spinosad	2 ml/m <sup>2</sup>	1		18 dagen
ZIEKTEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
<b>PHYTOPHTHORA</b>	Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, Zoxis 250 SC	azoxystrobin	1 ml/m <sup>2</sup>		zie (2)	
	Revus, Pergado V	mandipropamid	0,5 ml/m <sup>2</sup>	1		21 dagen
	Previcur Energy	fosethyl+propamocarb	20 ml/m <sup>2</sup>	1	zie (3)	21 dagen
<b>PYTHIUM</b>	Previcur Energy	fosethyl+propamocarb	20 ml/m <sup>2</sup>	1	zie (3)	
<b>SCLEROTINIA</b>	Dagonis	difenoconazool+fluxapyroxad	15 ml/m <sup>2</sup>	1		21 dagen
	Luna Privilege	fluopyram	1 ml/m <sup>2</sup>	1		21 dagen
	Switch, Serenva	cyprodinil+fludioxonil	4,5 g/m <sup>2</sup>	1		21 dagen
BACTERIE	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
<b>ERWINIA (BACTERIEROT)</b>	Hydro WG, Koperhydroxide WG, Ko-Plus 40	koperhydroxide	6 g/0,5 l/m <sup>2</sup>			
	Hydro Super 25 WG	koperhydroxide	9,6 g/0,5 l/m <sup>2</sup>			
	Cuperit, Cuprex 50%, Cuprex 50% WG, Curvata	koperoxychloride	4,8 g/0,5 l/m <sup>2</sup>		zie (4)	

## IN DE VOEDINGSOPLOSSING/BODEM

PLAGEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS voor 100 l voedingsoplossing	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
<b>AALTJES</b>	Nemguard GR	Knoflookextract	20 kg/ha	1	Inwerken in de bodem	
<b>RUPSEN</b>	Turex WG	Bacillus thur. ssp. aizawai GC-91	1 kg/ha	3	interval minstens 7 dagen	
ZIEKTEN	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS voor 100 l voedingsoplossing	TOEPASSINGEN	OPMERKING	WACHTTIJD
<b>PHYTOPHTHORA</b>	Paraat	dimethomorf	0,5g/100 l			
	Previcur Energy	fosethyl+propamocarb	40 ml	1	zie (3)	21 dagen
	Proplant	propamocarb	12,5 ml			
	Revus, Pergado V	mandipropamid	0,75 ml	1		21 dagen

(1) Tecto: het is noodzakelijk zeer strikt de goede agrarische praktijken toe te passen !!

(2) Azoxystrobin: enkel voor Norios en Zoxis 250SC: max 1 toepassing/teelt - wachttijd 21 dagen.

(3) Previcur Energy: om overschrijdingen van MRL te voorkomen, is het verboden om fosethyl-AI toe te passen tijdens de opslag (bewaring) of tijdens de forcerie, indien de wortels reeds op het veld met fosethyl-AI behandeld werden.

(4) Ko-Plus 40 en koperhydroxide WG kan soms fytotoxiciteit veroorzaken

\* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof

\* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten

\* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels", beschikbaar op [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be).

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op [fytoeweb.be](http://fytoeweb.be) en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

## PLAGEN

BZ= bufferzone

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
<b>BLADLUIZEN</b>	Movento (100 SC)	spirotriamat	0,45 l	2/12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 1 m	50 dagen
	Bandaka, Ultor 150 OD	spirotriamat	0,5 l	2/12 mnd	interval 14 dagen - BZ: 1 m	14 dagen
	Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 100 CS, Ninja	lambda-cyhalothrin	0,1 l	zie (1)	zie (1)	14 dagen
	Okapi	pirimicarb+lambda-cyhalothrin	1,5 l	1	BZ: 10 m	7 dagen
	Decis 15 EW, Patriot Protech, Split, Delete	deltamethrin	0,83 l	3	interval 7 dagen - BZ: 5 m	7 dagen
	Decis EC 2,5, Patriot, Splendid	deltamethrin	0,5 l	3/12 mnd	zie (2)	7 dagen
	Pirimor	pirimicarb	0,4 kg	2		
	Bio-Pyretrex	pyrethrinen+piperonylbutoxide	5 l	2	interval 7 dagen - BZ: 10 m	2 dagen
<b>NAAKTSLAKKEN</b>	Ferrex RB, Escar-Go	ijzerfosfaat	6 kg		BZ: 1m	
	Sluux, Derrex AS		7 kg/ha	1-4/12mnd	BZ: 1m	
<b>RITNAALDEN</b>	zaadbehandeling: Force of Force 200 CS	tefluthrin		1	enkel voor behandeling van omhulde zaaizaden	
<b>RUPSEN</b>	Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 100 CS, Ninja	lambda-cyhalothrin	0,075 l	zie (1)	zie (1)	14 dagen
	Okapi	pirimicarb+lambda-cyhalothrin	1,5 l	1	BZ: 10 m	14 dagen
	Decis 15 EW, Patriot Protech, Split, Delete	deltamethrin	0,83 l	3	interval 7 dagen - BZ: 5 m	7 dagen
	Decis EC 2,5, Patriot, Splendid	deltamethrin	0,5 l	3/12 mnd	zie (2)	7 dagen
	Bio-Pyretrex	pyrethrinen+piperonylbutoxide	5 l	2	interval 7 dagen - BZ: 10 m	2 dagen
	Xentari WG, Florbac	Bacillus thur. ssp. aizawai ABTS-1857	0,75-1 kg			0 dagen
	Dipel DF	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	0,5-1 kg	8	interval 7 dagen	0 dagen
	Turex WG	Bacillus thuringiensis ssp. aizawai	1 kg	3	interval 7 dagen	0 dagen
<b>WANTSEN</b>	Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 100 CS, Ninja	lambda-cyhalothrin	0,075 l	zie (1)	zie (1)	14 dagen
<b>WITLOOFMINEERVLIET</b>	Movento (100 SC)	spirotriamat	0,45 l	2/12 mnd	interval 14 dagen	50 dagen
<b>WOLLIGE WORTELLUIS</b>	Movento (100 SC)		0,75 l			50 dagen
	Bandaka, Ultor 150 OD	spirotriamat	0,5 l	2/12 mnd	interval 14 dagen	
<b>AALTJES</b>	Nemguard gr	knoflookextract	20 kg	1	inwerken in bodem	

(1) Lambda-cyhalothrin: enkel voor Karate Zeon, Ninja: max. 2 toepassingen/teelt - BZ: 10 m - enkel voor Karis 100 CS, Korado 100 CS: max. 3 toepassingen/teelt - BZ: 20 m.

(2) Decis EC 2,5 e.a.: Decis EC 2,5, Deltaphar, Demetrina 25 EC, Mezene, Patriot, Splendid, Splendour: enkel voor Decis EC 2,5, Patriot en Splendid: BZ: 10 m - enkel voor Deltaphar, Demetrina 25 EC, Mezene, Splendour: BZ: 5 m en een interval van 7 dagen

## BACTERIE

BZ= bufferzone

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	AANTAL TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
<b>ROTTE KROPPEN PSEUDOMONAS, ERWINIA</b>	Hydro WG, Koperhydroxide WG, Ko-Plus 40	koperhydroxide	2,5 kg	20	toepassen 3 weken voor de oogst - BZ: 5 m	2/12 mnd
	of Hydro Super 25 WG	koperhydroxide	4 kg	20	toepassen 3 weken voor de oogst - BZ: 5 m	2/12 mnd
	Cuperit, Cuprex 50 %, Cuprex 50 % WG, Curvata	koperoxychloride	2 kg	20	toepassen 3 weken voor de oogst - zie (1)	2/12 mnd

(1) Enkel voor Cuperit, Cuprex 50 %, Curvata: BZ: 2 m - enkel voor Cuprex 50 % WG: BZ: 5 m.

\* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof

\* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten

\* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels", beschikbaar op [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be).

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op [fytoeweb.be](http://fytoeweb.be) en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

## ZIEKTEN

BZ= bufferzone

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	AANTAL TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
<b>ALTERNARIA</b>	Geyser e.a.	difenoconazool	0,5 l	zie (3)	zie (3)	30 dagen
	Ortiva Top	azoxystrobin+difenoconazool	1 l	1	BZ: 1 m	30 dagen
	Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, Zoxis 250 SC	azoxystrobin	1 l	1	nevenwerking tegen echte meeldauw - zie (4)	21 dagen
	Signum, Terminett, Bospy	boscalid+pyraclostrobin	1,5 kg	2	interval 14-28 dagen - BZ: 10 m - max. 1 kg boscalid/ha/12 maanden	14 dagen
<b>ECHTE MEELDAUW</b>	Eminent, Belrose	tetraconazool	0,8 l	1		30 dagen
	Geyser e.a.	difenoconazool	0,5 l	zie (3)	zie (3)	30 dagen
	Opus Plus	epoxyconazool	1,5 l	1	BZ: 10 m - zie (1)	30 dagen
	Ortiva Top	azoxystrobin+difenoconazool	1 l	1	BZ: 1 m	30 dagen
	Karma	kaliumwaterstofcarbonaat	3 kg	8	interval 7 dagen	1 dag
	Cosavet, Hermovit, Kumulus WG, Thiovit Jet	zwavel	5 kg		preventief	0 dagen
<b>PHYTOPHTHORA</b>	Aliette WG, Fosevel	fosethyl	5 kg	2	interval 15 dagen - zie (5) BZ: 1m	14 dagen
<b>ROEST</b>	Eminent, Belrose	tetraconazool	0,8 l	1		30 dagen
	Geyser e.a.	difenoconazool	0,5 l	zie (3)	zie (3)	30 dagen
	Opus Plus	epoxyconazool	1,5 l	1	BZ: 10 m - zie (1)	30 dagen
	Ortiva Top	azoxystrobin+difenoconazool	1 l	1	BZ: 1m	30 dagen
	Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, Zoxis 250 SC	azoxystrobin	1 l	1	nevenwerking tegen echte meeldauw - zie (4)	21 dagen
	Signum, Terminett, Bospy	boscalid+pyraclostrobin	1,5 kg	2	interval 14-28 dagen BZ: 10 m - max. 1 kg boscalid/ha/12 maanden	14 dagen
<b>SCLEROTINIA</b>	Luna Sensation	fluopyram+trifloxystrobin	0,6 l	1	BZ: 5 m - zie (1), geen kardoen, selderij en knolvenkel als volgtteelt	21 dagen
	Signum, Terminett, Bospy	boscalid+pyraclostrobin	1,5 kg	2	interval 14-28 dagen BZ: 10 m - max. 1 kg boscalid/ha/12 maanden	14 dagen
	Contans WG (2 kg op 5 cm diepte, 4 kg op 10 cm)	Coniothyrium minitans	2-4 kg		inwerken in de bodem voor zaaien	0 dagen
<b>ZWARTROT RHIZOCTONIA</b>	Maxim 480 FS	fludioxonil	100 ml /100 kg zaden	1	zaadbehandeling	

(1) Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

(2) Lambda-cyhalothrin: enkel voor Karate Zeon, Ninja: max. 2 toepassingen/teelt - BZ: 10 m - enkel voor Karis 100 CS, Korado 100 CS: max. 3 toepassingen/teelt - BZ: 20 m.

(3) Geyser e.a.: Geyser, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Square 250 EC, Tapier, Tapier 250 EC: enkel voor Tapier 250 EC: toepassen vanaf begin wortelontwikkeling (diameter > 0,5 cm) - max. 1 toep./12 maanden - BZ: 10 m - enkel voor Geyser, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Square 250 EC, Tapier: max. 1 toepassing/teelt

(4) Azoxystrobin: enkel voor Ortiva, Zakeo 250 SC: BZ: 5 m - enkel voor Norios, Zoxis 250 SC: stadium: kiembladeren-typische vorm en grootte van de wortel bereikt - BZ: 20 m

(5) Aliette WG: om overschrijdingen van de MRL te voorkomen, kan fosetyl-aluminium na een toepassing op het veld, niet meer toegepast worden vóór bewaring of tijdens de forcerie - Wachtijd tussen toepassing in witloofwortelteelt en planten of zaaien van volggewas: 30 dagen.

\* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof

\* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten

\* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels", beschikbaar op [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be).

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op [fytoeweb.be](http://fytoeweb.be) en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

## ONKRUIDEN

BZ= bufferzone

	FASE	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per ha	AANTAL TOEPASSINGEN	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
<b>VOOR HET ZAAIEN</b>		Bonalan (inwerken in de bodem)	benfluralin	8 l		BZ: 20 m (min. 50 % driftreductie) zie (1)	
<b>VOOR OPKOMST</b>		Legurame, Carburame	carbeetamide	5 l		gebruik tot 30/11/2023 - max. 5 l/ha/teelt - zie (2)	
		Kerb 400 SC, Solitaire, Atapropy	propyzamide	2,8-3,1 l		max. 1,25 kg propyzamide/ha/12 maanden	
		Boa, Wopro penoxulam	penoxsulam	0,75 l		gefractioneerd - toepassen van droog zaad tot 5 bl. - BZ: 1m	
<b>NA OPKOMST</b>  Om het werkingsspectrum te vergroten worden de middelen best gecombineerd in een lage dosissysteem  Opm.: AZ 500 en Dual Gold/ Lecar of Frontier Elite niet mengen !	droog zaad 5-bladstadium	Boa, Wopro penoxulam	penoxsulam	0,75 l		gefractioneerd toepassen	
	kiembladstadium sluiten van de rijen	Safari	triflusulfuron-methyl	5-30 g		Safari: max. 60 g/ha/teelt - interval 7-10 dagen- BZ: 1m	
		Shiro 500	triflusulfuron-methyl	30g		Shiro 500: interval 7 dagen - BZ: 10 m	
	kiemlobstadium 6 bladstadium	AZ 500	isoxaben	0,2 l		eventueel gefractioneerd - BZ: 10 m - zie (1)	
	na-opkomst	Kerb 400 SC, Solitaire, Atapropy	propyzamide	2,8-3,1 l		max. 1,25 kg propyzamide/ha/12 maanden - BZ:1m	
	1-8 bladstadium	Frontier Elite, Arundo, Grometa	dimethenamide-p	0,1-0,6 l	4	max. 1 kg dimethenamide-p/ha/12 maanden - zie (3)	
	1-8 bladstadium	Dual Gold, Codal, Efica 960 EC, Lecar	S-metolachloor	0,1-0,6 l	3	max. 1,3 l/ha/12 mnd - interval 8 d. - BZ: 10 m - zie(4)	
	2-4 bladstadium	Legurame, Carburame	carbeetamide	1 l	2	gebruik tot 30/11/2023 - max. 5 l/ha/teelt - zie (2)	
	<b>Grassen</b>  niet mengen met andere herbiden erkend in na-opkomst:	Pantera	quizalofop-p-tefuryl	2,25 l	1	BZ: 1 m (min. 90% driftreductie) - zie (5)	60 dagen
		Centurion (1 l tegen kweek)	clethodim	0,5 l	1/12 mnd	BZ: 20 m (min. 50% driftreductie)	56 dagen
Select Prim (2 l tegen kweek)		clethodim	1 l	1/12 mnd	BZ: 20 m (min. 50% driftreductie)	56 dagen	
Fusilade Max		fluazifop-p-butyl	1-3 l	2	max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha/12 maanden - BZ: 1m		
	Targa Prestige, Targa Megamax	quizalofop-p-ethyl	1-3 l	1	toepassen na opkomst - zie (6)	28 dagen	

(1) Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

(2) Legurame, Carburame: max. 5 l/ha/teelt - voor opkomst: 5 l/ha - in het 2-4 bladstadium: gefractioneerd en max. 1 l/ha per toepassing - interval 7 dagen - Om residuproblemen te voorkomen moet een tijdsperiode van minstens 30 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of het planten van volgende teelt.

(3) Frontier Elite, Arundo, Grometa: interval 7-10 dagen - voorkeur verlaagde dosis van maximum 1 l/ha/teelt - BZ: 20 m - geen werking op varkensgras.

(4) Dual Gold: om grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op zand en lemig zandgronden (zoals aangegeven op de Bodemkaart van België, textuurklasse "Z" en "S").

(5) Pantera: Niet mengen met een hulpstof. - Een wachttijd van 120 dagen moet gerespecteerd worden voor het zaaien of het planten van de volgende teelt.

(6) Targa Prestige, Targa Megamax: de aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt.

## UITVLOEIS

	MIDDEL	ACTIEVE STOF	DOSIS per 100 l oplossing	OPMERKINGEN	WACHTTIJD
<b>NA OPKOMST</b>	Trend 90	isodecyl-alcohol ethoxylaat	50-100 ml	in menging met een erkend herbicide (100 ml bij spuitvolume 150-400 l/ha, 50 ml spuitvolume > 400 l/ha)	i.f.v. het middel waarmee gemengd wordt

\* Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof

\* Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten

\* De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document "Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels", beschikbaar op [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be).

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op [fytoeweb.be](http://fytoeweb.be) en volg de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.